



Antibiotikaprofylax – förskrivning som kräver kunskap och eftertanke

Lund, Bodil; Hultin, Margareta; Larsen, Tove

Published in:
Tandlaegebladet

Publication date:
2019

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Lund, B., Hultin, M., & Larsen, T. (2019). Antibiotikaprofylax – förskrivning som kräver kunskap och eftertanke. *Tandlaegebladet*, 123(5), 390-396. <https://www.tandlaegebladet.dk/antibiotikaprofylax-forskrivning-som-kraver-kunskap-och-eftertanke>

ABSTRACT

Antibiotikaprofylax i tandvården kan vara aktuellt inför invasiva ingrepp på patienter med ökad infektionskänslighet eller om ingreppet i sig medför en påtagligt ökad risk för infektion. Användandet av antibiotikaprofylax i tandvården är huvudsakligen baserat på tradition och rutin snarare än vetenskaplig evidens. På grund av de ökande problemen med antibiotikaresistens måste all antibiotikaanvändning vara motiverad. Nyttan med profylax bör därför alltid vägas mot eventuella nackdelar. Ett viktigt koncept vid antibiotika profylax är att patienten endast behöver skydd under pågående behandling varför en enkel dos i de flesta fallen är tillräckligt. Det är sannolikt relativt sällan behov för antibiotikaprofylax i allmäntandvård. Dock kan multipla faktorer, som i sig inte utgör indikation för antibiotika, tillsammans addera upp till ett behov att ordinera antibiotikaprofylax.

EMNEORD

Antibiotic prophylaxis | prescribing | indications | risks | contraindications



Henvendelse til førsteforfatter:

BODIL LUND

Bodil.lund@uib.no

Antibiotikaprofylax – forskrivning som kräver kunskap och eftertanke

BODIL LUND, professor, med dr, specialtandläkare, Institutt for klinisk odontologi, Medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge, Avdelningen for kjevekirurgi, Haukelands Universitets sjukehus, Bergen, Norge och Avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

MARGARETA HULTIN, odont dr, specialtandläkare, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

TOVE LARSEN, lektor, ph.d., Odontologisk Institut, Det Sundhedsvienskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark

► Accepteret til publikation den 16. oktober 2018

Tandlægebladet 2018;122;xxx-xxx

M

ED ANTIBIOTIKAPROFYLAX menas att man ordinerar antibiotika i syfte att förhindra infektion. Patienten som får antibiotikaprofylax har alltså inte per definition någon pågående infektion. Inom det odontologiska verksamhetsområdet finns det i princip två situationer när det kan vara aktuellt att ge antibiotikaprofylax: a) när

ingreppet i sig medför en påtagligt ökad risk för postoperativ infektion eller b) när det hos patienten finns en, eller flera, riskfaktorer som medför stor risk för infektion. Detta är sannolikt det området inom antibiotikaanvändning som har de största vetenskapliga kunskapsluckorna (1). Samtidigt kan omfattande eller felaktig användning av antibiotikaprofylax påtagligt inverka på den totala mängden forskrivning av antibiotika inom det odontologiska verksamhetsområdet (2). Ur ett såväl nationellt som internationellt perspektiv går åsikter starkt isär vad som skadar patienten mest, okritisk användning av antibiotikaprofylax eller undanhållande av densamma. Oavsett åsikt, måste all antibiotikaanvändning som baseras på rutin, tradition och/eller konsensus omvärderas och diskuteras i ljuset av den ökande antibiotikaresistensen. Så även antibiotikaprofylax.

Liten mikrobiologisk ordlista	
Antibakteriellt spektrum	Den grupp av bakterier som ett visst antibiotika riktar sig mot. Benämns som smalt respektive brett beroende om det är ett begränsat eller stort antal bakteriearter som avdödas.
Baktericid	Avdödande effekt (med avseende på bakterier)
Ekologisk störning	Störning i sammansättningen av kroppens normala mikrobiota. Kan orsakas av bland annat antibiotika.
ESBL	Extended spectrum betalactamases, ett bredspektrum enzym som produceras av vissa tarmbakterier och gör dem motståndskraftiga mot de flesta betalaktamantibiotika.
Kolonisationsresistens	Den normala mikrobiotans skydd mot utifrån kommande infektiösa agens under normala fysiologiska betingelser.
Selektion	Känsliga bakterier avdödas och motståndskraftiga överlever och förökas
Normal mikrobiota	De bakterier som återfinns på kroppens icke sterila ytor med kontakt med omvärlden inklusive hud, munhåla, magtarmkanal, nedre urinvägar och vagina.
Patogen	Bakterie som har potential att orsaka infektion.

PREPARATVAL, DOS, DURATION OCH TIMING

Preparatval

Vid val av preparat behöver man känna till vanliga bakteriella agens för den infektion man vill förebygga, deras naturliga känslighet för olika preparat, preparatets farmakokinetik och -dynamik samt resistensläget i det geografiska området man befinner sig. Ett rimligt empiriskt förstahandsbeslut idag, i de Nordiska länderna, är att som antibiotikaproylax ordinera amoxicillin. Detta preparat har utmärkt effekt på de bakterier som vanligen orsakar orala infektioner, och till skillnad från penicillin-V, en hög och förutsägbart absorption samt en duration som täcker in tiden för ett genomsnittligt dentoalveolärt ingrepp. Är patienten allergisk mot penicillin blir valet mer komplicerat. Tänkbara alternativ är klindamycin, cefalosporin, tetracyklin eller makrolider. Samtliga dessa preparat är att betrakta som kompromisser med sina sinsemellan inneboende för- och nackdelar, kontraindikationer och begränsningar. I Sverige, Norge och Danmark rekommenderas klindamycin vid penicillinallergi. Fördelarna är god effekt på de flesta bakterier som orsakar orala infektioner. Nackdelar är dock påtagliga ekologiska störningar på den normala mikrofloran samt en ökande resistensproblematik (3). I Finland rekommenderas

cefalosporin i första hand förutsatt att patienten inte haft en anafylaktisk reaktion på penicillin (4). Resonemanget bakom detta är att risken för korsallergi mellan penicillin och cefalosporin anses som liten. Finns anamnestiska uppgifter på anafylaktisk reaktion är det klindamycin som gäller även i Finland. I stora drag kan sägas att cefalosporin har samma nackdelar som klindamycin. Tetracyklin och makroliden erytromycin rekommenderas inte i något Nordiskt land på grund av den stora resistensproblematiken och omfattande ekologiska störningar i den skyddande normala mikrobiotan. Erytromycin har dessutom en relativt dålig effekt på anaeroba, mindre bra penetration i ben och uppvisar interaktioner med många andra läkemedel (5). Som alternativ till profylax, där målet är fakultativa orala streptokocker, rekommenderas i Danmark den nyare makroliden claritromycin vid vissa tillstånd, eftersom den ekologiska störningen blir mindre uttalad än vid användning av erytromycin (6).

En annan aspekt på preparatval är ingrepp i gränsområdet mellan odontologi och medicin. En vanlig missuppfattning inom medicin är att orala infektioner orsakas av samma bakterier som ger övre- och nedre luftvägsinfektioner, vilket kan leda till suboptimalt preparatval. Här har tandläkaren ett ansvar att upplysa om vad som gäller ur ett odontologiskt perspektiv, vid multidisciplinärt omhändertagande av infektioner.

Dos

Forskning saknas för vad som är den optimala dosen. Trenden är att den reduceras i nyare rekommendationer. Dock anses ofta att det är mer skadligt att ligga för lågt än för högt och profylaxdosen är därför av tradition högre än dosen vid behandling. Den vanligen rekommenderade dosen på 2 gram amoxicillin säkrar en baktericid koncentration i vävnad och blodbanan både under och timmarna efter ett ingrepp. Vid en-dosregim, framförallt peroralt, är dessutom risken för toxicitet mycket låg. Klindamycindosen som vanligtvis rekommenderas vid penicillinallergi är 600 mg.

Duration och timing

Undersökningar visar att det vanligaste felaktiga beteendet när det gäller ordination av antibiotikaproylax tycks vara att förlänga durationen utöver operationsdagen (1,7). Idag finns ingen forskningsstudie av hög kvalitet som rättfärdigar ett sådant förfarande (8-10). Tyvärr förekommer det däremot en del systematiska översikter, behäftade med allvarliga vetenskapliga metodfel, som påstår det motsatta. Det finns däremot indikationer på att så kallad "förlängd profylax" kan öka risken för postoperativ infektion (11,12). Ett annat mindre vanligt, men lika felaktigt, beteende är att inleda antibiotikaproylaxen några dagar innan ett ingrepp med motiv att ge "en steady-state av antibiotika i vävnaden". Det bygger på ett helt felaktigt antagande att antibiotika skulle bete sig på samma sätt som vissa andra läkemedel, vilket inte är fallet. Antibiotikaproylax skall ges som en preoperativ dos. Peroralt administreras dosen ca 1 timme innan planerat ingrepp för att säkra optimal koncentration vid operationsstart (13). Om operationstiden överstiger cirka 3 timmar kan man över- ►

våga att upprepa dosen för att täcka in hela operationstiden. När operationen är avslutad upphör relevansen att tillämpa antibiotikaföreskrivning i infektionsförebyggande syfte.

RISKER OCH KONTRAINDIKATIONER

Kroppens alla ytor som är i kontakt med omvärlden, inklusive hela magtarmkanalen, är täckt av bakterier, vår så kallade normala mikrobiota. Sammansättningen av den normala mikrobiotan har kunnat kopplas till en rad sjukdomar och tillstånd. Hälsa är korrelerat till en mikrobiota med stor diversitet, det vill säga att det finns många olika bakteriearter. All antibiotikaanvändning ger en så kallad selektion, vilket innebär att känsliga bakterier avdödas och motståndskraftiga överlever och förökas. Det gör att det blir en kraftigt reducerad diversitet, en så kallad ekologisk störning, i vår skyddande normala mikroflora när vi intar antibiotika. Kroppens normala mikrobiota har även många andra viktiga funktioner där kolonisationsresistens anses vara en av de viktigaste. Kolonisationsresistensen innebär ett skydd mot utifrån kommande infektiösa agens som beror på dels konkurrens om näring och bindningsställen men också normalflorbakteriernas produktion av antibakteriella peptider som kan angripa patogener. Antibiotikabehandling stör kolonisationsresistensen och banar därmed väg för nya infektioner. När balansen i vår normala mikrobiota skadas, som vid antibiotikaanvändning, ökar också individens risk att exponering av resistent bakterier leder till bärarskap. Detta bärarskap innebär att till exempel MRSA eller ESBL blir en del av världens normala mikroflora. Utöver detta föreligger en risk för interaktion med andra läkemedel och biverkningar som kan vara alltifrån milda övergående besvär till allvarliga, potentiellt livshotande. Samtliga

risker med antibiotika är påtagligt reducerade när man använder ett smalspektrigt preparat, det vill säga ett preparat som riktar sig mot ett begränsat antal bakteriearter (Fig. 1) (Se kommentar Fig. 1).

Nyare data indikerar att även en dos av antibiotika ger selektion av resistent bakterier och ekologisk störning hos normala mikrobiotan (14). Eftersom antalet friska bärare av antibiotikaresistens ökar så kan det idag talas om en individuell risk vid antibiotikaföreskrivning. Så kan t ex antibiotikaprofylax teoretiskt utgöra en ökad risk för utveckling av en svårbehandlad antibiotikaresistent infektion om det ges till bäraren, så att de känsliga bakterierna slås ut medan de resistent tilltar i antal och orsakar infektion (14). Det har till

FAKTARUTA 1: CLOSTRIDIUM DIFFICILE DIARRÉ

Clostridium difficile

En grampositiv anaerob sporbildande bakterie som en del bär i lågt antal i sin tarm. Vid antibiotikabehandling sker selektion och ekologisk störning av normala mikrobiotan varvid överväxt av *C. difficile* kan ske och sjukdom utvecklas. På grund av att *C. difficile* bildar sporer kan det vara väldigt svårt att kontrollera smittspridningen i sjukhusmiljö.

Patogenes

Bakterien bildar toxiner som ger upphov till vävnadsskada och diarréer.

Sjukdom

Sjukdomsbilden varierar från lindriga diarréer till livshotande sjukdom med blodiga diarréer och hög feber. Kan även ge en svårbehandlad diarré som pågår i månader. En fruktad komplikation till *C. difficile* diarré är pseudomembranös colit, vilket har en mortalitet på ca 20 %.

Predisponerande faktorer

- Antibiotikabehandling, framförallt bredspektrum antibiotika såsom klindamycin och cefalosporiner.
- Sjukhusvistelse. Förekommer även som samhälls-smitta.
- Nedsatt värd. Hög ålder.

Headline?




Fig. 1. Illustration av risken för negativa effekter på värdet vid administration av antibiotika. Procentintervallen reflekterar att effekten varierar mellan olika preparat.
Fig. 1. Illustration of the risk for negative effects on the host after administration of antibiotics. The range in percent reflects differences between different compounds.

exempel rapporterats fall av den allvarliga *Clostridium difficile* diarrén efter en profylaktisk dos med klindamycin (15,16) (Faktaruta 1). Vidare har en engelsk registerstudie redovisat ett betydande antal *C. difficile* infektioner, varav en del med dödlig utgång, efter administrering med klindamycin som profylax (17).

Penicillinallergi

Äkta penicillin-allergi har uppskattats till att finnas hos färre än 1 % av befolkningen. Misstolkning av icke-allergiska hudslag och andra typer av biverkningar såsom magtarmsvävar antas ligga till grund för den falskt höga frekvensen av penicillin-allergi som föreligger. Då alla alternativ till penicillin vid orala infektioner är att betrakta som kompromisser är det viktigt att försöka få klarhet i om en angiven allergi verkligen är bekräftad hos läkare. Ofta kan många förväxlingar mellan t ex orolig mage under antibiotika behandling och allergi uppdagas genom att några kontrollfrågor ställs till patienten. Om oklarhet föreligger får patienten betraktas som allergisk tills en utredning hos läkare är utförd. Ett ytterligare motiv att utreda oklar allergi mot antibiotika är att behandling av vissa antibiotikaresistenta infektioner annars kan kompliceras påtagligt. Så har man vid t ex infektion med en ESBL-producerande bakterie hos en penicillin-allergisk patient förlorat det enda riktigt bra behandlingsalternativet som finns att behandla den aktuella patienten med.

ANTIBIOTIKAPROFYLAX – ETT ETISK DILEMMA?

Med den kunskap vi har idag, och den resistensutvecklingen som föreligger, är det inte acceptabelt att använda antibiotika-profylax om inte andra infektionsminimerande åtgärder samtidigt är vidtagna. Att genomföra en operation utan steril dukning är till exempel tveksamt ur ett lege artis perspektiv. Om dessutom antibiotikaproylax brukas vid ett sådant ingrepp föreligger ett påtagligt etiskt problem. Ibland uppstår situationer då ingrepp akut behöver göras på ofullständigt utredd patient eller där timingen i relation till annan pågående behandling, såsom cytostatika eller strålning, måste kompromissas. I dessa lägen kan antibiotikaproylax utgöra ett viktigt supplement till behandlingen. Det är dock viktigt att i möjligaste mån ha goda rutiner för oral sanering innan operationer och behandlingar som annars medför en ökad risk för infektion när de väl igångsatts, såsom högdos bisfosfonatbehandling, strålbehandling, organtransplantationer, hjärklaffsoperation och cytostatikabehandling. Att ha ett infektionsminimerande arbetssätt är idag en mycket viktig del av rationell antibiotikaanvändning och därmed hållbar utveckling.

INDIKATIONER

Det finns väldigt få absoluta indikationer för antibiotikaproylax. En rad tillstånd som traditionellt har diskuterats som möjliga riskfaktorer för infektioner utgående från munhålan betraktas inte längre som indikationer för antibiotikaproylax (Tabell 1). Indikationer för antibiotikaproylax kan antingen vara en riskpatient eller ett riskingrepp. Riskingreppet innebär att åtgärden i sig utgör en påtaglig ökad risk för infektion

klinisk relevans

Antibiotikaproylax kan ibland vara indicerat inför en invasiv behandling hos tandläkaren. De huvudsakliga indikationerna för antibiotikaproylax är en infektionskänslig patient eller att ett ingrepp ska utföras, som medför stor risk för infektion. Det är inte alltid lätt att avgöra om en patient är i riskzonen för en infektion. Inför denna bedömning är det viktigt att väga samman alla patientens riskfaktorer. Åsikter går isär när det kan vara aktuellt att ordinera antibiotikaproylax. Med den utveckling av antibiotikaresistens som vi ser idag måste dock all förskrivning av antibiotika vara välgrundad.

oavsett patientens status. Riskpatienten kännetecknas antingen av patientfaktorer som påtagligt ökar risken för infektion eller där en potentiell infektion utgör en oacceptabel risk för en skör patient (Tabell 1).

En svår grupp att bedöma är patienter med multipla riskfaktorer, som var och en för sig inte utgör indikation för antibiotikaproylax, men som tillsammans kan addera upp till en påtaglig risk för infektion. I sådana fall krävs både eftertanke samt kunskap och ansvarig läkare kan behöva kontaktas.

Vid samtliga möjliga indikationer för antibiotikaproylax gäller att optimerad munhygien och strikt vårdhygien är väl så viktiga faktorer för att förebygga infektion.

RISKINGREPP

Ett fåtal ingrepp anses som absoluta indikationer för antibiotikaproylax. Hit hör frakturkirurgi och ortognatkirurgi (8,18). Utöver detta kan t ex implantatkirurgi i vissa fall betraktas som ett riskingrepp. Det finns visst stöd i litteraturen för att okomplicerad implantatkirurgi på frisk patient inte utgör någon indikation för antibiotikaproylax (9,10). När det gäller benaugmentation saknas evidens, men enligt de svenska konsensusriktlinjerna rekommenderas 2 g amoxicillin preoperativt (18).

Bakteriemi

För vissa riskpatienter gäller att de ska skyddas vid ingrepp som kan orsaka bakteriemi från munhålan. Här bör tydliggöras att man har väldigt lite kunskap om vilka ingrepp detta egentligen rör sig om. De studier som är gjorda på bakteriemi är utförda med olika metoder, visar divergerande resultat samt saknar i allmänhet data på mängden bakterier som kommer ut i blodet. Dessutom vet man inte om det är exponeringsfrekvensen, det vill säga antalet bakteriemi, eller mängden/dosen bakterier som kommer ut i blodet, som har störst betydelse. Att använda synlig blödning som indikation på att bakteriemi föreligger har visat sig vara osäkert. Däremot har undersökningar visat större förekomst av bakteriemi hos patienter med parodontit än hos personer med friska parodontala förhållanden (19). Därför råder det enighet om att gott munhålestatus är det viktigas- ►

Antibiotikaprofylax?

Status	Betydelse ur infektionssynpunkt
Avsaknad av mjälte	Framförallt ökad risk för infektion med kapslade bakterier såsom pneumokocker och <i>Haemophilus influenzae</i> . Då dessa inte orsakar orala infektioner är det ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Bisfosfonatbehandling, låg dos i.v. eller per oralt	Ingen evidens att profylax är till nytta. Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Bisfosfonatbehandling i.v. till cancer patienter	Denna patientkategori har en relativt hög risk för bisfosfonatinducerad käkbensnekros i samband med benskadade ingrepp. Evidens saknas om antibiotika utgör något skydd men på grund av tillståndets allvarlighetsgrad så rekommenderas antibiotikaprofylax inför benskadande ingrepp såsom tandextraktion och dentoalveolär kirurgi.
Bröstimplantat	Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Central venkateter (CVK)	Framförallt ökad risk för infektion med stafylokocker. Ej indicerat med antibiotikaprofylax inom tandvården.
Cystisk fibros	Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Diabetes, dålig metabolisk kontroll	Laboratorievården som indikerar långvarig dålig metabolisk kontroll (HbA1c > 7 %, 9-12 mmol/L) eller förekomst av grava komplikationer till sjukdom (amputationer, blindhet etc). Antibiotikaprofylax kan vara indicerat.
Diabetes, välkontrollerad	Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Dialysbehandling	Evidens saknas för samband mellan infektion och munhålan. Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
HIV	Hos vuxna framförallt ökad risk för svamp och virusinfektioner. Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Hjärtsjukdom	Ingen ökad risk för infektioner utgående från munhålan vid kranskärlssjukdom, by-pass opererad, hjärtinfarkt, stenoser, stentar, shuntar, pace-maker eller hjärtflimmer. Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Hypogammaglobulinemi	Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Högdos strålbehandling mot käkben	Evidens saknas. Stark konsensus att ge antibiotikaprofylax.
Högrisk för infektiös endokardit	Medfött cyanotisk hjärtfel, inopererad hjärtaflack samt tidigare genomgången endokardit utgör högriskfaktorer för att utveckla infektiös endokardit. För ställningstagande till antibiotikaprofylax hänvisas till respektive lands nationella riktlinjer. Låg tröskel för att kontakta och rådgöra med patients kardiolog rekommenderas, speciellt vid allvarligare hjärtfel.
IgA-brist	Ej indicerat med antibiotikaprofylax
Kortison	Vid långtidsbehandling med > 20 mg/dag kan antibiotikaprofylax övervägas
Ledprotes	Framförallt ökad risk för infektion med stafylokocker och andra hudbakterier. Vid väl inläkt protes (>3 månader efter operation), ej indicerat med antibiotikaprofylax. Om nyligen opererad patient, skjut om möjligt upp behandlingen eller konsultera patientens läkare.
Organtransplantation	Avstå om möjligt invasiv tandbehandling under de 3-6 första månaderna efter transplantation. När organet väl är inläkt så ger underhållsbehandlingen ökad risk för framförallt virus- och svampinfektioner. Ej indicerat med antibiotikaprofylax.
Reumatisk sjukdom, medicinbehandlad	Ger vanligen en svag immunosuppression. Ej indicerat med antibiotikaprofylax men medicinering bör ställas in i samråd med reumatolog.
Rökning	Viss ökad risk för infektioner generellt sett. Ej indicerat med antibiotikaprofylax. Patienten bör rekommenderas rökstopp inför alla typer av kirurgiska ingrepp.
Solid tumör	Om utan samtidig tung immunosuppressiv behandling eller neutropeni föreligger ingen indikation för antibiotikaprofylax.
Övervikt	BMI > 25-40 utgör viss ökad risk för infektion. Ej indicerat med antibiotikaprofylax.

Tabell 1. Patientfaktorer och dess inverkan på risken för infektion med dental/oralt ursprung samt om antibiotikaprofylax rekommenderas eller ej. För faktorer som inte föranleder antibiotikaprofylax kan detta likväl vara aktuellt om multipla riskfaktorer föreligger samtidigt. Fotnot, tabellen ej att betrakta som en fullständig redogörelse av alla risker för postoperativa infektioner då detta ligger utanför scope av denna artikel.

Table 1. The influence of different patient factors on the risk of development of infection with dental or oral origin and the corresponding recommendation regarding antibiotic prophylaxis. Prophylactic antibiotics may also be indicated when multiple factors, that individually do not indicate their use, occur simultaneously. The table is not to be regarded as a complete account of all possible risks for postoperative infections since this is beyond the scope of this article.

te skyddet mot bakteriemier. Det är dessutom det enda sättet patienten kan skyddas mot bakteriemier som sker i vardagen t ex vid daglig munvård.

RISKPATIENTER

Endokarditrisk

Patienter med ökad risk för infektiös endokardit har traditionellt fått antibiotikaprofylax inför invasiva ingrepp, inkluderande tandvård, för att skydda hjärtats endokardium mot bakteriemier. Evidensen för endokarditprofylax är svag och egentligen finns idag inget vetenskapligt bevis på att det är indicerat (20). Mot detta vägs att ca 25-30 % av endokarditerna orsakas av orala streptokocker som har en speciell benägenhet att binda till det skadade endotelet och där orsaka en vegetation av bakterier (Faktaruta 2). Internationellt har man över tid reducerat indikationerna för endokarditprofylax till att i mitten på 2000-talet endast omfatta patienter med hög risk

för endokardit. Dessa högriskfaktorer omfattar kongenitalt cyanotiskt hjärtvitium, inopererad hjärtklaffprotes samt tidigare genomgången endokardit. Storbritannien var först ut att rekommendera att man upphör med endokarditprofylax 2008, följt av Sverige 2012 (18,19). Beslut att avskaffa endokarditprofylaxen i Sverige skedde i samråd med representanter från Svensk Cardilogförening samt från Svenska infektionsläkarföreningen. I Storbritannien har det på senare år registrerats en ökning i förekomsten av infektiösa endokarditer, vilka man inte med säkerhet kunnat härleda till rekommendationen från 2008 då man upphörde med endokarditprofylax (22,23). En ökning av endokarditer har under samma tidsperiod också rapporterats från andra länder som inte har avskaffat endokarditprofylaxen, vilket gör epidemiologin svårtolkad (24). I Sverige, har man hittills inte sett någon signifikant ökning av infektiösa endokarditer efter avskaffandet av endokarditprofylaxen (25). Å andra sidan vet man inte helt säkert i vilken utsträckning, och på vilka patienter, riktlinjerna efterlevts i Sverige. Kliniska studier är svåra att utföra då incidensen är så låga att orimligt stora studiepopulationer behövs för att besvara frågan (26). Säkert är dock att det saknas övertygande evidens på antibiotikaprofylaxens roll vid endokarditrisk, och därtill kommer att tillgänglig litteratur tolkas olika. Efter genomgång av nyare publikationer har NICE och Svenska Läkemedelsverket beslutat att inte ändra rekommendationen medan Norge, Finland och Danmark fortsatt rekommenderar endokarditprofylax i överensstämmelse med European Society for Cardiology, det vill säga att ge antibiotikaprofylax till den begränsade gruppen högriskpatienterna (27). Förespråkare för restriktiv hållning menar att det är ologiskt att ge profylax för den bakteriemien som uppstår vid tandvård medan patienten är helt oskyddad mot den dagliga bakteriemien som uppstår vid aktiviteter som tuggning och tandborstning. Gemensamt för alla rekommendationer är att vikten av regelbunden tandvård och god oral hälsa är viktigt för att reducera bakteriemier från munhålan. Tills evidensläget är klarare bör dock de inhemska rekommendationerna följas. För tandläkaren bör också tröskeln för att konsultera patientens kardiolog vara låg, och det är viktigt att titta på den sammanvägda förekomsten av olika riskfaktorer.

FAKTARUTA 2: INFEKTIÖS ENDOKARDIT

Patogenes

Endotelskada på hjärtklaff blottar underliggande kolagen. Fibronectin i blodet binder till detta och bildar ett möjligt bindningsställe för viridansstreptokocker.

Predisponerade faktorer

- Bland annat hjärtvitium, klaffprotes, tidigare endokardit
- Ca 40 % av de som insjuknar saknar predisponerande faktor

Mortalitet

Totalt ca 12 % men beror på den orsakande bakteriearten.

Infektion med:

- Stafylokocker & enterokocker ca 20 % mortalitet
- Viridansstreptokocker ca 5 % mortalitet

Vanligaste bakteriella agens

Stafylokocker (ca 40 %)
Orala streptokocker (ca 25 %)
Enterokocker (ca 10 %)

Grav immunosuppression

Exakt vad som definierar när gravt nedsatt immunförsvar föreligger är inte helt klart utan är egentligen en glidande skala. I detta avseende menas patienter som har en påtagligt ökad risk för infektioner vid invasiva ingrepp i munhålan. Dessa bör få antibiotikaprofylax inför ingrepp såsom tandextraktion, dentoalveolär kirurgi och subgingival depuration. Detta gäller till exempel patienter med pågående tung immunosuppressiv behandling, vilket kan vara aktuellt de första månaderna efter transplantationer (organ- benmärg- stamcells-) eller vid behandling av en avstöttningsreaktion. Lågt antal neutrofila granulocyter ($< 1,0 \times 10^9/L$) till följd av sjukdom eller mediciner eller vid uttalad defekt granulocytfunktion (t ex myelodysplastisk syndrom) bör också betraktas som indikationer för antibiotikaprofylax vid ovan angivna ingrepp. ►

FRAMTIDENS KRAV PÅ ÖKAD KUNSKAP

Sammanfattningsvis vilar området antibiotikaprofylax i tandvården i stor utsträckning på empiri, erfarenhet och ett kliniskt resonemang. För att möta upp mot dagens behov av rationell

antibiotikaanvändning behövs såväl forskning kring förskrivningsmönster, hur skriftliga riktlinjer och rekommendationer omsätts i praktiken och vad som styr klinikerns beslutsfattning, liksom effektivitet och risker med antibiotikaprofylax. ♦

ABSTRACT (ENGLISH)

PROPHYLACTIC ANTIBIOTICS – PRESCRIPTION THAT REQUIRES KNOWLEDGE AND REFLECTION

Antibiotic prophylaxis in dentistry can be indicated prior to invasive treatments either because the patient has increased susceptibility for developing infection or because the planned procedure poses a significant inherent risk for infection. The usage of antibiotic prophylaxis in odontology is mainly based on tradition and routine rather than scientific evidence. Because of the increasing problems with antibiotic resistance all anti-

biotic utilization needs to be scrutinized. Therefore, today the benefit of antibiotic prophylaxis must be weighed against the possible risks. An important concept of antibiotic prophylaxis is to merely protect the patient during the treatment, meaning that a single dose is normally sufficient. Circumstances indicating the use of prophylactic antibiotics are probably relatively rare in the general dental practice. Prophylactic antibiotics may also be indicated when multiple factors, that individually do not indicate their use, occur simultaneously.

LITTERATUR

- Österberg M, Holmlund A, Sunzel B et al. Knowledge gaps in oral and Maxillofacial Surgery: A Complex Systematic Review. *Int J Technol Assess Health Care* 2017;33:93-102.
- Khalil D, Hultin M, Andersson Fred L et al. Antibiotic prescription patterns among Swedish dentists working with dental implants surgery. Adherence to recommendations. *Clin Oral Implants Res* 2015;26:1064-9.
- Kim MK, Chuang SK, August M. Antibiotic Resistance in Severe Orofacial Infections. *J Oral Maxillofac Surg* 2017;75:962-8.
- THE FINNISH MEDICAL SOCIETY DUODECIM. Hammasperäiset äkiliiset infektioner ja mikrobilääkkeit. Helsinki 2017. (Set 2018 november). Tillgänglig fra: URL: www.kaypahoito.fi
- Lund B, Skoog G, Götrick B et al. Antibiotika för systemiskt bruk. *Tandläkartidningen* 2014;106:64-74.
- DANSK CARDIOLOGISK SELSKAB. Behandlingsvejledning 7. Infektioner endocarditis 2017. (Set 2018 november). Tillgänglig fra: URL: <http://nbv.cardio.dk/endocarditis>
- Pyysalo M, Helminen M, Anttalainen AK et al. Antibiotic prophylaxis patterns of Finnish dentists performing dental implant surgery. *Acta Odontol Scand* 2014;72:806-10.
- STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteratursöversikt. SBU 2000 2010;200:1-468.
- Lund B, Hultin M, Tranæus S et al. Complex systematic review - Perioperative antibiotics in conjunction with dental implant placement. *Clin Oral Implants Res* 2015; 26 (Supp 11):1-14.
- Klinge B, Flemming T, Cosyn J et al. The patient undergoing implant therapy. Summary and consensus statements. The 4th EAO Consensus Conference 2015. *Clin Oral Implants Res* 2015;26 (Supp 11):64-7.
- Gerlach KL, Pape H-D. Untersuchungen zur Antibiotikaprophylaxe bei der operativen Behandlung von Unterkieferfrakturen. *Dtsch Z Mund Kiefer Gesichts Chir* 1988;12:497.
- Giridhar VU. Role of nutrition in oral and maxillofacial surgery patients. *Natl J Maxillofac Surg* 2016;7:3-9.
- Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL et al. The timing of prophylactic administration of antibiotics and the risk of surgical-wound infection. *N Engl J Med* 1992;326:281-6.
- Khalil D, Hultin M, Rashid MU et al. Oral Microflora and Selection of Resistance after a Single Dose of Amoxicillin. *Clin Microbiol Infect* 2016;22:949.
- Balch A, Wendelboe AM, Vesely SK et al. Antibiotic prophylaxis for surgical site infections as risk factor for infection with *Clostridium difficile*. *PLoS ONE* 2017;12:e0179117.
- Hansen D, Pollan LD, Fernando H. Fulminant *Clostridium difficile* colitis: A complication of perioperative antibiotic prophylaxis. *J Oral Maxillofac Surg* 2013;71:1880-5.
- Thornhill MH, Dayer MJ, Prendergast B et al. Incidence and nature of adverse reactions to antibiotics used as endocarditis prophylaxis. *J Antimicrob Chemother* 2015;70:2382-8.
- Allander A, Aronsson B, Baecklund E et al. Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården. Information från Läkemedelsverket 2012;5:22-35.
- LÄKEMEDELVERKET. Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp. 2016. (Set 2018 november). Tillgänglig fra: URL: <https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Antibiotikaprofylax-for-att-forebygga-endokardit-i-samband-med-odontologiska-ingrepp/>
- Forner L, Larsen T, Kilian M. Incidence of bacteremia after chewing, tooth brushing and scaling in individuals with periodontal inflammation. *J Clin Periodontol* 2006;33:401-7.
- Glenny AM, Oliver R, Roberts GJ et al. Antibiotic for the prophylaxis of bacterial endocarditis in dentistry. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;10: doi: 10.1002/14651858.
- Thornhill MH, Dayer MJ, Forde JM et al. Impact of the NICE guideline recommendation cessation of antibiotic prophylaxis for prevention of infectious endocarditis: before and after study. *BMJ* 2011;342:d2392. doi: 10.1136.
- Dayer MJ, Jones S, Prendergast B et al. Incidence of infective endocarditis in England, 2000-13: a secular trend, interrupted time-series analysis. *Lancet* 2015;385:1219-28.
- Grape M, Franck-Larsson K. Riktlinjer vid infektiös endokardit: Preliminär uppdatering förespråkar fortsatt restriktiv antibiotikaprofylax. *Tandläkartidningen* 2015;9:64-5.
- SVENSK ENDOKARDITREGISTER. Årsrapport 2016. (Set 2018 november). Tillgänglig fra: URL: http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/kvalreg_inf_2016_endokardit.pdf
- Que YA, Moreillon P. Infective endocarditis. *Nat Rev Cardiol* 2011;8:322-36.
- Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ et al. The task force for the management of infective endocarditis of the European Society of Cardiology. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. *Eur Heart J* 2015;36:3075-128.

